

ISSN 0219-9491 非卖品






胶囊
0.8-1.2 g/次，每日2-3次。
• 肝、肾功能损害者不宜使用。
• 避免突然停药。
皮下注射：≤2 mL/次/日，
• 可能引起激动作用（行为过度、紧张、失
mesylate
应减量使用。
• 慎用于高尿酸血症，或有痛风史
Nimodipine
30-60 mg/次，
每日3次，连用
12-24周。
• 可能引起胃肠道反应，
呕、头痛、虚弱、失眠、多
• 严重肝功能不良患者禁用
关于药物的用量用法和注意事项，请参阅《MIMS中国药品手册年刊》

神经保护、修复、营养及其相关药物

药物	用法用量	用药须知
β-七叶皂苷钠 Aescin	治疗脑水肿 10-20 mg/次，每日1-2次	• 主要不良反应为注射部位疼痛、静脉炎、瘙痒
奥拉西坦 Oxiracetam	注射剂 4-6 g/次/日，静滴，可酌情增减用量，疗程一般为2-3周。 胶囊 800 mg，2-3次/日。	• 可能出现皮肤瘙痒、精神兴奋、睡眠紊乱，罕见胃部不适。 • 严重肾功能损害者禁用注射剂。 • 轻、中度肾功能不全者应减量慎用。 • 患者出现精神兴奋和睡眠紊乱时，应减量。
胞二磷胆碱 Citicoline	注射剂 125-250 mg/日，静注或肌注。 口服 200-600 mg/日，分2-3次口服。	• 主要不良反应为失眠、僵复、头痛、眩晕、兴奋、痉挛，有时瘫痪肢麻木感可能出现或加重；恶心、食欲不振；肝功能异常；一过性复视、热感感、血压波动。 • 用于急性期意识障碍患者时，最好在卒中发作后的2周内开始给药。
吡拉西坦	注射剂	• 可能引起消化道不良反应、中枢神经系统不良

MIMS中国 mims.com

A 药物治疗（续）


前庭抑制剂

- 倍他司汀：是组胺H_3受体的强拮抗剂，可选
整内耳毛细血管的通透性；增加颈内动脉的血流，改善脑循环，从而缓解眩晕；促进内耳淋巴液的分泌和吸收，消除内耳水肿；平

急性期症状的作用。

常用药物的用法用量

药物	用法用量	用药须知
倍他司汀 betahistine	口服制剂 6-12 mg/次，每日3次。 注射剂 2-4 mg/次，每日1-2次肌注。	• 可能出现胃肠道不适、皮肤瘙痒。个别病例出现头痛。 • 有消化性溃疡病史或活动性溃疡、支气管哮喘、肾上腺髓质瘤患者慎用。
银杏叶提取物 Ginkgo	口服剂型 20-40 mg/次，每日3次。 注射剂型 17.5 mg/次/日，深部肌肉注射；或35-70 mg/次，每日1-2次静滴，最大剂量为87.5 mg/次，每日	• 可能引起头痛、头晕，心悸，胃肠道反应，静脉输注可能引起静脉炎。 • 孕妇、婴幼儿禁用。 • 过


药名的汉语拼音顺序排列
2m. 止血剂
2m. 止血剂
ACEUTICAL GROUP
tid，肌注或静注或静滴。预防手术出
血：0.25 - 0.5 g，术前15 - 30分钟静
0.25 g，0.5 - 1.5 g/日。
该产品所在的页码。如仅知道药物的药理作用与分类，