
ISSN 0219-9491 非卖品



C 药物治疗（续）

- 中效制剂（半衰期6-20小时）：包括艾司唑仑、阿普唑仑、氯氮䓬、劳拉西泮、此类药物很少单独发挥镇静催眠作用，但较易产生积蓄。
- 短效制剂（半衰期<6小时）：包括三唑仑、[illegible]，起效快，无积蓄，无后遗作用，但易诱发前向性遗忘，白天焦虑。

- 吡喹酮是一种药物，主要用于轻、中度AD或VCI/VaD患者。
- 吡拉西坦，可改善、保护神经元，改善脑缺氧及损伤因素造成的脑损伤，改善脑


阿尔茨海默病与痴呆
神经修复、营养及其相关药物
mesylate
Nimodipine
关于药物的用量用法和注意事项，请参阅《

神经保护、修复、营养及其相关药物

药物	用法用量	用药须知
β-七叶皂苷钠 Aescin	治疗脑水肿 10-20 mg/次，每日1-2次	• 主要不良反应为注射部位疼痛、静脉炎、瘙痒及皮疹。
奥拉西坦 Oxiracetam	注射剂 4-6 g/次/日，静滴，可酌情增减用量，疗程一般为2-3周。 胶囊 800 mg，2-3次/日。	• 可能出现皮肤瘙痒、精神兴奋、睡眠紊乱，罕见胃部不适。 • 严重肾功能损害者禁用注射剂。 • 轻、中度肾功能不全者应减量慎用。 • 患者出现精神兴奋和睡眠紊乱时，应减量。
胞二磷胆碱 Citicoline	注射剂 125-250 mg/日，静注或肌注。 口服 200-600 mg/日，分2-3次口服。	• 主要不良反应为失眠、倦怠、头痛、眩晕、兴奋、烦躁、恶心、食欲不振；肝功能异常；一过性复视、热感、血压波动。 • 用于急性期意识障碍患者时，最好在卒中发作后的2周内开始给药。
吡拉西坦	注射剂	• 可能出现消化道不良反应、中枢神经系统不良

A 药物治疗（续）

前庭抑制剂

- 倍他司汀：是组胺H_3受体的强拮抗剂，可选

耳淋巴液的分泌和吸收，消除内耳水肿；平

减退、耳迷路综合征。

糖皮质激素

常用药物的用法用量

改善内耳循环的药物

药物	用法用量	用药须知
培他司汀 Betahistine	口服制剂 6-12 mg/次，每日3次。 注射剂 2-4 mg/次，每日1-2次肌注。	• 可能出现胃肠道不适、皮肤瘙痒。个别病例出现头痛。 • 有消化性溃疡病史或活动性溃疡、支气管哮喘、肾上腺髓质瘤患者慎用。

【警告/注意事项】有胃溃疡合并症
血栓性肺炎的患者慎用。由于本药
对症治疗，停止给药后，有再次
发的可能。
【不良反应】注射部位疼痛、发

悦康药业集团
YOUCARE PHARMACEUTICAL GROUP

2m. 止血剂
Haemostatics

悦康通®
银杏叶提取物注射液

氨基己酸
Aminocaproic acid
【适应症】纤溶性出血，包括肺出

【用法
1 g tid，口服，或0.25～0.5 g bid，

【规格/包装】注射液

【规格/包装】注射液